



ANSM - Mis à jour le : 06/01/2026

Dénomination du médicament

CARBOLEVURE ADULTES, gélule
Levure déshydratée vivante, Charbon activé

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CARBOLEVURE ADULTES, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
3. Comment prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Charbon médicinal en association, - code ATC : A07BA51
Les substances actives de CARBOLEVURE sont la levure déshydratée vivante et le charbon activé.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte :

- en cas de digestion difficile, notamment avec ballonnement intestinal.

- en complément de la réhydratation et/ou des mesures diététiques, dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée.
- En cas de déshydratation, c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée (soif intense, sensation de langue sèche), votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

Ne prenez jamais CARBOLEVURE ADULTES, gélule :

- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre CARBOLEVURE.

Faites attention avec CARBOLEVURE ADULTES, gélule :

Mises en garde spéciales

En cas de diarrhée, vous devez consulter votre médecin dans les cas suivants :

- en l'absence d'amélioration au bout de 3 jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre supérieure à 39°C,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de maux de ventre anormalement élevés,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Précautions d'emploi

- En cas de ballonnement, flatulences (gaz intestinaux), évitez les légumes secs (comme les lentilles, les flageolets et les pois) ainsi que certains légumes verts (comme le choux, le chou-fleur, le brocoli, ou le pain au son ou complet).
- En cas de diarrhée, il est nécessaire de :
 - o Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres).
 - o S'alimenter le temps de la diarrhée,

§ en excluant certains aliments et particulièrement les crudités, les fruits non pelés, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.

§ en privilégiant les viandes maigres, les pommes de terre et le riz.

Un apport en liquide adapté doit être envisagé, en particulier chez les patients âgés.

En cas de doute n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et CARBOLEVURE ADULTES, gélule

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments pris par voie orale. Par mesure de précaution, veillez à prendre CARBOLEVURE, au moins à 2 heures de distance de tout autre médicament.

CARBOLEVURE ADULTES, gélule avec des aliments et boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

CARBOLEVURE n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

CARBOLEVURE ADULTES, gélule contient

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réserve à l'adulte.

La dose recommandée est de 3 gélules par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avalez les gélules sans les ouvrir avec un verre d'eau.

Durée du traitement

La durée du traitement est de 3 jours.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent, un avis médical est requis.

Si vous avez pris plus de CARBOLEVURE ADULTES, gélule que vous n'auriez dû

La prise de doses élevées de CARBOLEVURE peut entraîner une constipation. En cas de surdosage ou ingestion accidentelle, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables observés avec une fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles) :

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des symptômes de l'effet indésirable suivant, car vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical d'urgence :

- Réaction allergique généralisée soudaine, grave et potentiellement mortelle en l'absence de soins médicaux immédiats (réaction anaphylactique), au cours de laquelle vous pouvez présenter une éruption de la peau (telles qu'urticaire, démangeaisons), un gonflement, des difficultés à respirer, une accélération du rythme cardiaque, des étourdissements, de la transpiration, une chute de la tension artérielle et/ou une perte de conscience/évanouissement.

Les autres effets indésirables qui peuvent survenir sont :

- Noircissement des selles (altération de la couleur des fèces).
- Éruption cutanée (rash), démangeaison (prurit), éruption cutanée avec démangeaison (urticaire).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient CARBOLEVURE ADULTES, gélule

- Les substances actives :

Levure déshydratée vivante contenant au minimum 10^8 cellules de *Saccharomyces cerevisiae* par gramme 108,5 mg

Charbon activé..... 109,0 mg

Pour une gélule n°1.

- Les autres composants sont :

Povidone, silice colloïdale anhydre.

Composition de l'enveloppe de la gélule :

o Tête : oxyde de fer noir (E172) - dioxyde de titane (E171) – gélatine.

o Corps : érythrosine (E127) – oxyde de fer rouge (E172) – dioxyde de titane (E171) – gélatine.

Qu'est-ce que CARBOLEVURE ADULTES, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gélule noire et écarlate contenant une poudre noire. Boîte de 20, 30, 40 ou 60 gélules sous plaquettes.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

PIERRE FABRE MEDICAMENT

LES CAUQUILLOUS

81500 LAVAUR

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PARC INDUSTRIEL DE LA CHARTREUSE

81100 CASTRES

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

ETABLISSEMENT PROGIPHARM

RUE DU LYCEE

45500 GIEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).